

## Dilatación Gástrica / vólvulo (GDV): ¿Qué debe saber?

Las siguientes razas: Gran Danés, Pastor Alemán, Setter Irlandés, Gordon Setter, Rottweiler, Poodle Estándar, Weimaraner, Akita Americano, Bloodhound, Collie Rough, Wolfhound Irlandés, Terranova y San Bernardo, tienen una predisposición genética para la GDV. La mortalidad se estima en un promedio de 30%. El índice de recurrencia para los perros con este problema es de un promedio del 11% durante 3 años.

Hasta el momento, se han encontrado dos factores de riesgo ligados a la alimentación: una sola toma de comida al día y comer demasiado rápido. Sin embargo, parece que la naturaleza de los alimentos no se encuentra entre los reales factores de riesgo. Sin embargo, suministrar un solo tipo de comida aumenta las posibilidades de sufrir GDV, pero esto es así para todos los tipos de alimentos.

La novedad es que cuando se da alimento deshidratado, el tamaño de las croquetas juega un papel, con un riesgo más elevado con las croquetas más pequeñas de 30 milímetros. Entonces, ¿es más peligroso alimentar a los perros con croquetas? No realmente. La dilatación gástrica no está causada por las croquetas que fermentan en el estómago, sino por tragar grandes cantidades de aire (aerofagia).

¿Cuál es el consejo para los dueños de perros?

- Dé porciones más pequeñas y de 3 a 4 comidas al día.
- Disminuya la ingesta de agua: nada de agua hasta 1 hora después de comer.
- Ningún movimiento o ejercicio hasta 1 hora después de comer (ésta es la primera causa de GDV), por tanto, reducir el estrés después de la comida.
- Dar comida más energética (cantidades más pequeñas pero con un mayor índice de grasa, origina que el estómago se vacíe más lentamente).
- Nunca utilice recipientes elevados para la comida o bebida.
- Limpiar los recipientes para comer y beber regularmente.

Una operación realizada a menudo, la gastropexia, se usa en la prevención. La gastropexia puede prolongar el período de recurrencia a 547 días, comparados con los 188 días y con la mortalidad para el Rottweiler reducida en 2,2 veces y 29,6 veces para el pastor alemán.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes con GDV que experimentan este tipo de operación pueden seguir sufriendo una dilatación gástrica ocasionalmente.

**Dr. Wim Van Kerkhoven – Viyo International**

Sitio web: [www.viyo-elite.com](http://www.viyo-elite.com)