

El Tumor Venéreo Transmisible - (TVT)

Cátedra de Reproducción Animal. Fac.Cs.Vet. U.N.L.P

El tumor venéreo transmisible (TVT) es frecuente en nuestro medio.

Afecta a los perros sin predilección de raza ni sexo, aunque aparece más comúnmente en los animales jóvenes de vida libre y sexualmente activos.

Se localiza preferentemente en los genitales externos (mucosa vulvar, vaginal, peneana o prepucial), aunque puede tener localizaciones extragenitales (piel, cara, nariz).

La transmisión ocurre mediante el trasplante de células tumorales desde un individuo afectado a uno sano a través del contacto sexual, lamido, mordedura o rascado.

Luego de un período de incubación de aproximadamente 3 semanas pueden visualizarse sobre las regiones afectadas áreas rojizas, irregulares, cuyo tamaño varía desde algunos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. El tumor tiene forma de coliflor, es friable, se desprende y sangra con facilidad y ocasionalmente puede ulcerarse.

En los animales afectados aparecen descargas hemorrágicas prepuciales o vulvares.

El lamido constante sobre las áreas afectadas agrava las lesiones.

Al aumentar de tamaño el tumor llega a exteriorizarse y hacerse visible en los genitales externos.

Las metástasis (tumores secundarios formados a partir del tumor inicial) son pocos frecuentes.

El diagnóstico de TVT se realiza mediante el estudio de las células tumorales.

Tiene un buen pronóstico en la mayoría de los casos y responde bien a la quimioterapia, que es el tratamiento de elección. La administración de fármacos pertenecientes al grupo de los alcaloides de la Vinca, como la Vincristina, proporciona resultados satisfactorios en pocas semanas y la curación definitiva ocurre en más del 90% de los pacientes. En aquellos animales en los cuales el tratamiento farmacológico no ha sido eficaz, la radioterapia es una buena opción.

Como medidas preventivas deben aplicarse el aislamiento de los animales portadores del tumor, evitar el contacto de perros sanos con perros afectados y realizar el control ginecológico de las hembras y andrológico de los machos antes del servicio.

Ante la aparición de alguno de los signos citados consulte inmediatamente con su profesional veterinario.

Med. Vet. Vangioni Patricia, Pasante

Med. Vet. Stornelli Maria Alejandra, Jefe de Trabajos Prácticos

Cátedra de Reproducción Animal.

Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de La Plata