

Evaluación de la Clomipramina como ayuda para la terapia de la conducta en el tratamiento del síndrome de separación en perros.

*A. L. Podberscek, Y. Hsu, J. A. Serpell, Animal Welfare and Human-Animal Interactions Group, Department of Clinical Veterinary Medicine, University of Cambridge, Madingley Road, Cambridge CB3 0ES
The Vet Record Volume 145, Number 13, Pages 365-370 25th September 1999*

49 perros mostrando signos de problemas relacionados con la separación fueron asignados aleatoriamente a tres grupos:

Grupo A (15 perros) recibieron un placebo 2 veces por día;

Grupo B (17 perros) recibieron clomipramina de 0,5 a 1 mg/Kg 2 veces diarias;

y Grupo C (17 perros) recibieron clomipramina de 1 a 2 mg/Kg 2 veces diarias.

Todos los perros recibieron además terapia conductual. Sus propietarios completaron cuestionarios sobre el comportamiento de sus perros al principio, y en la primera, cuarta y octava semanas del tratamiento con clomipramina. Se usaron escalas bipolares para clasificar los comportamientos en "general", "apego excesivo" y "síndrome de separación".

Se utilizaron pruebas de Kruskal-Wallis y correlaciones de Kendall Rank para determinar cualquier diferencia entre los grupos en tratamiento, y la asociación entre los puntajes iniciales y los cambios de comportamiento luego de una semana de administración de la clomipramina.

Se usaron estadísticas de Mantel-Haenszel para evaluar las diferencias entre el efecto de la clomipramina y el placebo, y se utilizó el test de Page para evaluar el efecto de la terapia conductual en sí misma.

No hubo diferencias demográficas importantes entre los dueños de los perros asignados a los tres grupos. Los perros tenían poca diferencia de edad entre los grupos, y los animales tratados con clomipramina fueron los que mostraron problemas a una edad más temprana que los del grupo placebo.

El tratamiento con clomipramina tuvo un efecto supresivo sostenido en los niveles generales de actividad y un efecto mucho más modesto en la tendencia a solicitar demasiado contacto físico con sus dueños.

Los signos típicos de los problemas relacionados con la separación no fueron afectados significativamente por el tratamiento con clomipramina, pero la terapia de conducta por sí misma fue altamente efectiva en reducir los problemas de comportamiento.