

GIARDIA VAX



DESCRIPCION

Vacuna inactivada contra el parásito Giardia lamblia de uso en caninos.

COMPOSICION

| | |
|---|--|
| Trofozoitos inactivados de Giardia lamblia: | |
|---|--|

ACCION

Vacuna contra Giardia lamblia (antígeno inactivado).

INDICACIONES

Inmunización activa en caninos sanos para prevenir la enfermedad y diseminación causada por la infección provocada por Giardia lamblia.

Inyectar una dosis en perros de 8 semanas. Repetir una segunda dosis 2 a 4 semanas después.

Se recomienda la revacunación anual.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

La giardiasis es una zoonosis que puede producir trastornos gastrointestinales en caninos y humanos. Una vez enfermo el animal, queda expuesto a otras patologías más graves. La infección ocurre a través de quistes que luego se transforman en trofozoítos en el intestino, afectando principalmente al duodeno.

Los trofozoítos evolucionan a quistes infectantes eliminándose por materia fecal.

Es por ello que la higiene adecuada y la vacunación son importantes para proteger la salud del animal y de los humanos. La vacunación ayuda a interrumpir la diseminación de quistes al medio ambiente y por ende la posibilidad de contagio.

Recuerde que la giardiasis es de difícil diagnóstico con las pruebas convencionales de laboratorio, pudiéndose obtener falsos negativos. Frente a una sospecha clínica, se recomienda avisar al laboratorio para que realice la prueba conveniente. Ante la confirmación del diagnóstico, sugiera a su cliente que visite al médico avisando de esta parasitosis en su animal.

Conservar entre 2 y 7°C.

Como con todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS COLATERALES

Como puede suceder con cualquier producto inyectable, pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. En este caso, aplicar epinefrina.

DOSIFICACION

La dosis es de 1 ml por vía subcutánea (SC).

ESPECIES



PRESENTACION

Frasco de 1 dosis (1 ml).

APLICACION

Inyectable

