

# *Instrucciones de cómo actuar en caso de Torsión de Estómago (BLOAT)*

---

*Fuente: Fundación del Collie Club of America*

*Traducción: Ana Sibilis*

La torsión es una condición seria y potencialmente mortal en los perros.

Las muestras clínicas del bloat pueden variar desde inquietud ocasional, intentos de vomitar y o mover el intestino, hasta la muerte.

Aprenda reconocer los síntomas del bloat y evaluar el estómago de su perro. Si se pone grande y duro como una sandía está sufriendo de bloat, si está pequeño y comprimido es normal.

Aprenda también a evaluar el color de las membranas mucosas. Si son rosado oscuro es normal, si palidecen a color de rosa claro, azul o gris, es anormal.

Aprenda evaluar el tiempo capilar del repuesio (indicación del estatus del sistema circulatorio): las mucosas normales de color de rosa oscuro quedarán blancas al ser presionadas por 3 segundos con su pulgar y volverán rápidamente al color rosa oscuro en un plazo de 3-4 segundos después de quitar su pulgar; las mucosas en un perro con shock tardarán de 6-10 segundos en volver lentamente a su color original.

Cuanto más largo es el tiempo de repuesio, la condición del perro es más seria.

## **Cuando usted ha determinado que su perro tiene bloat, haga lo siguiente:**

- 1) Llame a su veterinario
- 2) Adminístrele de 1-3 jeringuillas de simethicone por vía oral
- 3) Si el perro vomita el simethicone y continúa con bloat use una aguja de 14 x 1 1/2 " insertándola 2 " detrás de la costilla última derecha. Introduzca firmemente la aguja para descomprimir el estómago y quitar el aire.
- 4) Repita el paso 3 si se repite la hinchazón.

### **Para pasar el tubo de Bloat:**

Mida desde la nariz hasta 2 pulgadas por detrás de la última costilla del perro y marque su tubo de bloat con la cinta blanca. Lubrique el extremo del tubo. Con ayuda de una persona o de una mordaza manténgale la boca abierta. Pase firmemente pero suavemente el tubo hasta que usted alcanza su cinta blanca de marcación. Si el perro tose, saque el tubo y comience otra vez. Si el perro ofrece resistencia, levántelo y sosténgalo por debajo de las axilas y rote suavemente el cuerpo a la izquierda mientras que avanza el tubo.

Una vez que el tubo entre en el estómago, trate de parar al perro (o ayúdelo a acostarse si no puede sostenerse parado). Aprete el estómago para vaciarlo.

Lleve el perro inmediatamente al veterinario.